



# ÄRGER AM LAUFENDEN BAND, WURM?



Parasiten im Darm direkt  
angehen – mit Droncit®:  
die gezielte Wurmkur für  
Hund und Katze.\*

**Die Nummer 1\*\***  
in der Apotheke



\* Droncit® Tabletten für Hunde und Katzen – Droncit® Spot-on für Katzen

\*\* Bei Wurmmitteln für Hunde und Katzen (GfK 2015)

**Droncit®**

# IST DER WURM DRIN?

Wenn der Bandwurm Ärger macht.



Liebe Leserinnen und Leser,

ist der Wurm einmal drin, sorgt er für Unruhe im Darm Ihres Haustieres. Er beeinträchtigt das Immunsystem und kann zu Erkrankungen von Hund und Katze führen. Die zusätzliche Gefahr: Wurmbefall kann auch Menschen gefährlich werden. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Haustier schnell vom Bandwurm befreit wird:

**Mit der Wurmkur von Droncit® sind Sie und Ihr Haustier den Ärger schnell wieder los – und der Parasit ist der „Gewurmte“!**

## Ärger am laufenden Band

Ihren Namen verdanken Bandwürmer ihrem flachen, bandartigen Körper. Der Bandwurm wächst, indem ständig neue Bandwurmeier gebildet werden. Ausgewachsene Bandwürmer leben im Darm ihrer Wirte und ernähren sich dort vom reichhaltigen Angebot an Nahrung.



**Es gibt etwa 3.500 Bandwurmart. Wichtige Arten bei Hund und Katze sind:**



**Gurkenkernbandwurm**  
(*Dipylidium caninum*)  
ca. 45 cm lang



**Kleiner Fuchsbandwurm**  
(*Echinococcus multilocularis*)  
nur 3 mm lang



**Katzenbandwurm**  
(*Taenia taeniaeformis*)  
bis zu 60 cm lang

## Wie sich Hunde den Ärger einfangen

Auslaufplätze in der Stadt und „Hundeklos“ sind oft mit Wurmeiern kontaminiert. Das Aufsammeln und das Entfernen des Kots haben daher eine große hygienische Bedeutung.

## Übertragung über Floh und Co.

Die Entwicklung des Bandwurms beginnt mit der Ausscheidung einzelner Bandwurmglieder über den Kot von Hund und Katze und verläuft über sogenannte „Zwischenwirte“. Das können je nach Bandwurmart Flöhe, aber auch kleine Nager sein.




## Vom Ei zum Bandwurm

Nach ihrer Ausscheidung trocknen die Bandwurmglieder des Gurkenkernbandwurms aus, platzen auf und lassen Eier frei. Diese Eier werden von Flohlarven aufgenommen und entwickeln sich in ihrem Inneren zu Bandwurmlarven.

Verschluckt und zerbeißt das Haustier einen infizierten Floh, gelangen die infizierten Stadien in den Darm. Dort wachsen sie zum Bandwurm heran, der mit der Produktion einer neuen Generation beginnt.

Beim Gurkenkernbandwurm vergehen vom Verschlucken des Flohs bis zum Ausscheiden der ersten Segmente etwa 3 Wochen.



### In 3 Schritten beugen Sie effektiv vor:



**1** Schützen Sie Ihren Vierbeiner vor Flöhen.



**2** Säubern Sie Ihre Schuhe/die Pfoten des Hundes, um keine Wurmeier ins Haus zu tragen. Darüber können sich auch Wohnungskatzen infizieren.



**3** Entwurmen Sie Ihren Vierbeiner regelmäßig.

# KLEINE RAUPE NIMMERSATT?

## Der Bandwurm ist ein gefährlicher Vielfraß

Bandwürmer verankern sich mit dem Kopfbereich in der Darmschleimhaut und entziehen Hund und Katze wichtige Nährstoffe – er „frisst“ sozusagen mit.

### Gefahr für Ihr Haustier

Ein Bandwurmbefall kann daher gefährliche Folgen haben: Bandwurmbefall kann zu Verdauungsstörungen führen, die mit Verstopfung oder Durchfall einhergehen. Eine verminderte Immunabwehr macht das Tier oft anfällig für andere Erkrankungen.

### ... und Ihre ganze Familie

Manche Bandwürmer können beim versehentlichen Verschlucken von Bandwurmeiern auch im Menschen heranwachsen. Die infektiösen Stadien einiger Bandwurmartarten können Organe schädigen. Besonders gefährlich ist der Fuchsbandwurm. Er verursacht die sogenannte alveoläre Echinokokkose, die zu einer lebensgefährlichen Schädigung von Organen, besonders der Leber, führen kann.



### Gefährlich verschmust – für Kinder gilt erhöhtes Risiko:

Kinder schmusen gern mit Tieren und denken dabei nicht immer an die Hygiene. So kann es passieren, dass sie das Tier streicheln und sich anschließend beispielsweise ein Gummibärchen in den Mund stecken, ohne sich vorher die Hände zu waschen.



## Entwürmen? Aber sicher!

Als Besitzer eines Hundes oder einer Katze können Sie dafür sorgen, dass Ihr Vierbeiner frei von Würmern bleibt – mit regelmäßiger Entwurmung. Dazu gibt es Empfehlungen der unabhängigen Expertenorganisation ESCCAP\*. Regelmäßige Entwurmung ist sinnvoll, da die Behandlung gegen Bandwürmer oder andere Würmer nicht vorbeugend wirkt.

## Mindestens alle 3 Monate

Hunde und Katzen sollten generell mindestens alle 3 Monate mit einem Mittel gegen Rund- und Bandwürmer entwurmt werden. Ein Produkt gegen eine Mischinfektion erhalten Sie bei Ihrem Tierarzt oder auf Rezept auch in Ihrer Apotheke.

## Bei erhöhtem Risiko häufiger entwürmen

Ihr Tier liebt **rohes Fleisch**, v.a. Innereien wie Leber und Lunge:

### ▶ Alle 6 Wochen gegen Bandwürmer behandeln

Ihr Tier hat **unbeaufsichtigten Auslauf**, frisst wilde Nagetiere, Aas oder wird bei der Jagd eingesetzt:

### ▶ Alle 4 Wochen gegen Bandwürmer behandeln

Ihr Tier hatte **Flöhe**:

### ▶ Umgehend gegen Bandwürmer behandeln



### So erkennen Sie Wurmbefall:






- ▶ Reiskornähnliche, häufig bewegliche Bandwurmglieder im Kot, Fell, Afterbereich oder im Bereich der Liegeplätze
- ▶ Rutscht das Tier mit seinem Po über den Boden (sog. „Schlittenschleichen“), weist dies auf Juckreiz im Analbereich und einen möglichen Bandwurmbefall hin

# ÄRGER AM LAUFENDEN BAND, WURM?

Gehen Sie den Parasiten direkt an – mit Droncit®

Die gezielte, einfache und sanfte Wurmkur für Hund und Katze\*:

-  **Gezielt** → Droncit® bekämpft sowohl reife als auch unreife Bandwurmstadien.
-  **Einfach** → Eine einmalige Gabe von Droncit® reicht aus, um Bandwürmer wirksam zu bekämpfen.
-  **Sanft** → Der Wirkstoff in Droncit® ist gut verträglich. Daher kann Droncit® auch bei trächtigen und säugenden Tieren angewendet werden.

## Droncit® im 4-Punkte-Programm

Flöhe sind Hauptüberträger des Gurkenkernbandwurms. Daher gehört zu einer Flohbehandlung immer auch eine Bekämpfung des Bandwurms:

1

Bekämpfung der Flöhe am Tier



(z. B. mit Advantage®, Bolfo® Flohschutz-Shampoo, Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray sowie Bolfo® Halsband, Kiltix® oder Seresto®)

2

Vorbeugung eines Flohbefalls am Tier



(z. B. mit Advantage®, Bolfo® Zecken- und Flohschutzband, Kiltix® oder Seresto®)

3

Bekämpfung der Flöhe in der Umgebung



(z. B. mit Bolfo® Umgebungsspray oder Bolfo® Fogger)

4

Bekämpfung des Bandwurms



(z. B. mit Droncit® Tabletten oder Droncit® Spot-on)

**4-Punkte-Programm?**

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke ausführlich beraten!

## Droncit® Tablette – einfache Anwendung für Hund und Katze

Die Droncit® Tablette entweder direkt oder eingehüllt in Wurst/Fleisch oder zerkleinert mit dem Futter verabreichen:

- Zur Entwurmung bei Hund und Katze
- Bekämpft alle wichtigen Bandwurmart von Hund und Katze
- Dosierung nach Körpergewicht



## Droncit® Spot-on-Lösung – speziell für Katzen

Die Spot-on-Lösung für stressfreies Entwurmen der Katze einfach auf die Haut im Nacken aufträufeln:



Fell scheiteln



Gesamte Lösung auf die Haut auftragen

- ✓ Für besonders stressfreies Entwurmen der Katze
- ✓ Die Katzenhaut ist anders als die des Hundes, daher kann der Wirkstoff die Haut durchdringen
- ✓ Zur Bekämpfung des Gurkenkern- und des Katzenbandwurms
- ✓ Dosierung nach Körpergewicht \*\*





## Auch in Ihrer Apotheke:

### Advantage® Schnell und wirksam gegen Flöhe bei Hunden und Katzen



**Advantage® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde, Katzen und Zierkaninchen. Wirkstoff:** Imidacloprid. **Anwendungsgebiete:** Zur Vorbeugung und Behandlung des Flohbefalls bei Hunden und Katzen, zur Behandlung des Haarlingbefalls (*Trichodectes canis*) bei Hunden sowie zur Behandlung des Flohbefalls bei Zierkaninchen. Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplanes zur Kontrolle der Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern diese zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. Advantage® für Hunde: Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung von Advantage® werden die auf dem Hund befindlichen Flöhe abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 4 Wochen lang gegen Flöhe. Advantage® für Katzen und Zierkaninchen: Die am Tier befindlichen Flöhe werden innerhalb eines Tages nach Behandlung abgetötet. Die einmalige Behandlung wirkt 3 bis 4 Wochen lang gegen Flöhe bei Katzen und bis zu einer Woche bei Zierkaninchen. **Warnhinweise:** Nicht anwenden bei unter 8 Wochen alten Saugwelpen. Nicht anwenden bei Kaninchen, die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind. Nicht anwenden bei Zierkaninchen, die jünger als 10 Wochen alt sind. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:** Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 09/2014.

**Bolfo® Umgebungsspray und Bolfo® Fogger gegen Flöhe bei Hunden und Katzen. Bolfo® Umgebungs-spray und Bolfo® Fogger** nicht am Tier anwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für Katzen und kleine Hunde, Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für große Hunde, Bolfo® Flohschutz-Shampoo, Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray. Wirkstoff:** (2-Isopropoxyphenyl) (methylcarbamat). Für Tiere: Hunde und Katzen. **Anwendungsgebiete:** Zecken- und Flohschutzband: Zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Katzen und Hunden. Das Puderband setzt den Wirkstoff kontinuierlich frei. Flöhe werden innerhalb weniger Stunden nach Anlegen des Halsbandes abgetötet. Angesaugte Zecken werden nach etwa einem Tag abgetötet. Sie können dann leicht entfernt werden oder fallen spontan ab. In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und abfallen, ohne in der Regel Blut gesaugt zu haben. Wirkungsdauer gegen Flöhe: bis zu 4 Monate. Wirkungsdauer gegen Zecken: bis zu 10 Wochen. Flohschutz-Spray: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden und Katzen. Flohschutz-Shampoo: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden. **Warnhinweis:** Tiere, die ein Bolfo® Zecken- und Flohschutzband tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 02/2016.

**Droncit® Spot-on 40 mg/ml, Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen. Wirkstoff:** Praziquantel. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung von Bandwurminfektionen der Katze. Bandwurmmittel gegen reife und unreife Darmstadien von *Dipylidium caninum* und *Taenia (Hydatigera) taeniaeformis*. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig.** Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 04/2014.

**Droncit® 50 mg Tablette für Hunde und Katzen. Wirkstoff:** Praziquantel. Für Tiere: Hunde, Katzen. **Anwendungsgebiete:** Bandwurmmittel zur Anwendung bei Hunden und Katzen. Gegen reife und unreife Darmstadien von *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp., *Taenia (Hydatigera) taeniaeformis*. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig.** Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 04/2016.

**Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung (*Ctenocephalides felis*) und Vorbeugung (*Ctenocephalides felis*, *C. canis*) eines Flohbefalls mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Seresto® kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Floh-allergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, eine repellerende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall mit *Ixodes ricinus* und *Rhipicephalus sanguineus* mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel bietet indirekten Schutz gegen eine Übertragung der Krankheitserreger *Babesia canis vogeli* und *Ehrlichia canis* durch die Vektorzecke *Rhipicephalus sanguineus*. Dadurch wird das Risiko einer Babesiose und einer Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Behandlung gegen Haarlingsbefall (*Trichodectes canis*). Idealerweise sollte das Halsband vor Beginn der Floh- oder Zeckensaison angewendet werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. **Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber:** Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 08/2014.