

nikofrenon®

... endlich rauchfrei!



HEUMANN

Anwendungsgebiet

nikofrenon® unterstützt die Entwöhnung von Zigaretten und anderen Erzeugnissen aus Tabak. Es reduziert die Entzugssymptome der Nikotin-Abhängigkeit und erleichtert den Ausstieg von der Sucht nach Zigaretten, Zigarillos, Zigarren und anderen Tabakprodukten.

Anwendung und Wirkstoff

Nicotinhaltes transdermales Pflaster.

Gut verträglich

Stufenweise wird 9 - 12 Wochen immer weniger Nicotin zugeführt. So werden körperliche Entzugserscheinungen deutlich gemindert.

Einfache und komfortabel

1 x täglich ein Pflaster aufkleben. nikofrenon® gibt über den Tag hinweg gleichmäßig Nicotin ab – ohne unangenehmen Geschmack. Und Sie haben Ruhe rund um die Uhr!

Drei Wirkstärken

Nikofrenon® gibt es in 3 Wirkstärken. So kann die Entwöhnung an den persönlichen Zigaretten- bzw. Tabakkonsum angepasst werden:

nikofrenon® 10, 17,5 mg Nicotin;
nikofrenon® 20, 35 mg Nicotin;
nikofrenon® 30, 52,5 mg Nicotin;

Packungen mit 7, 14 und 28 Pflastern
Packungen mit 7, 14 und 28 Pflastern
Packungen mit 7, 14 und 28 Pflastern

| Zigarettenkonsum | Startphase 3-4 Wochen | Fortsetzungsphase 3-4 Wochen | Ausklang 3-4 Wochen |
|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Mehr als 20 Zigaretten am Tag | nikofrenon® 30 | nikofrenon® 20 | nikofrenon® 10 |
| Bis einschließlich 20 Zigaretten am Tag | nikofrenon® 20 | nikofrenon® 20 | nikofrenon® 10 |

HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG · Südwestpark 50 · 90449 Nürnberg · www.heumann.de

Hinweis: nikofrenon® sollte 9 - 12 Wochen angewendet werden, bevor eine Beurteilung der Wirksamkeit erfolgt.

HEUMANN · bewährt seit 1913

nikofrenon

... endlich rauchfrei!



HEUMANN

| nikofrenon [®] | PZN | ApU | AEP | AVP |
|---|----------|---------|---------|---------|
| nikofrenon [®] 10 (17,5 mg) 7 PFT | 14448069 | 13,28 € | 15,27 € | 25,99 € |
| nikofrenon [®] 10 (17,5 mg) 14 PFT | 14448075 | 21,30 € | 24,50 € | 39,95 € |
| nikofrenon [®] 10 (17,5 mg) 28 PFT | 14448081 | 39,34 € | 45,24 € | 69,98 € |
| nikofrenon [®] 20 (35 mg) 7 PFT | 14448098 | 13,28 € | 15,27 € | 25,99 € |
| nikofrenon [®] 20 (35 mg) 14 PFT | 14448106 | 23,42 € | 26,93 € | 43,90 € |
| nikofrenon [®] 20 (35 mg) 28 PFT | 14448112 | 39,34 € | 45,24 € | 69,98 € |
| nikofrenon [®] 30 (52,5 mg) 7 PFT | 14448129 | 13,28 € | 15,27 € | 25,99 € |
| nikofrenon [®] 30 (52,5 mg) 14 PFT | 14448135 | 23,42 € | 26,93 € | 43,90 € |
| nikofrenon [®] 30 (52,5 mg) 28 PFT | 14448141 | 39,34 € | 45,24 € | 69,98 € |

Stand 15.05.2019

Für weitere Informationen kontaktieren Sie den HEUMANN-Kundenservice **0800- 4 386 266** oder Ihren Außendienstmitarbeiter von HEUMANN PHARMA.

nikofrenon[®] 10 17,5 mg; transdermales Pflaster, **nikofrenon[®] 20**; 35 mg; transdermales Pflaster, **nikofrenon[®] 30**; 52,5 mg; transdermales Pflaster. **Wirkstoff:** Nicotin. **Zusammensetzung:** **nikofrenon 10**: 1 transdermales Pflaster enthält 17,5 mg Nicotin, **nikofrenon 20**: 1 transdermales Pflaster enthält 35 mg Nicotin, **nikofrenon 30**: 1 transdermales Pflaster enthält 52,5 mg Nicotin. **Sonstige Bestandteile:** Acrylat/Vinylacetat/Methacrylat-Copolymer, mittelkettige Triglyceride, basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph. Eur.), Papier, Poly(ethylenterephthalat), aluminiumbeschichtet, braune Drucktinte, Poly(ethylenterephthalat), aluminiumbeschichtet und silikonisiert. **Anwendungsgebiete:** Linderung v. Nicotinentzugssymptomen, Unterstützung d. Raucherentwöhnung b. Nicotinabhängigkeit. Eine Beratung u. Betreuung d. Patienten erhöhen in d. Regel d. Erfolgsraten. **Gegenanzeigen:** Überempf. geg. d. Wirkstoff od. e. d. sonst. Bestandt., Systemische Hauterkrankungen, instab. o. verschl. Angina pectoris, Status unmitelbar n. Myokardinfarkt, schweren Arrhythmien, vor kurzem aufgetretenem Schlaganfall, Vasospasmen, Phäochromozytom, Kinder, Nichtraucher, Gelegenheitsraucher. **Nebenwirkungen:** generalisierte allerg. Reaktionen w. generalisierte Urtikaria, angioneurotisches Ödem, anaphylaktische Reaktionen, allerg. Reaktionen, Kontaktsensibilisierung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, abnorme Träume, Schwindel, Agitation, Angstgefühle, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, motorische Störungen, emotionale Labilität, Reizbarkeit, depressive Verstimmung, Verwirrung, Gedächtnisstörungen, Parästhesie, Geschmacksanomalien, Dysphagie, Tremor, Zuckungen, Migräne, Sehstörungen, Palpitationen, Schmerzen i. Thorax, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckveränderungen, Husten, Infekt d. ob. Atemwege, Dyspnoe, Übelkeit, Bauchschmerzen, Dyspepsie, Erbrechen, Verstopfung, Diarrhö, Flatulenz, abnormer Stuhl, Mundtrockenheit, Gingivitis, Magengeschwür, Reaktionen a. d. Applikationsstelle w. brennendes Gefühl, Ödeme, Erytheme, Pruritus, Exantheme, Urtikaria, Blasenbildung, Zwicken. Verstärktes Schwitzen, Akne, Reaktionen a. d. Applikationsstelle w. Hautverfärbungen, Hyperpigmentierung, Vasculitis. Muskelschmerz, Gelenkschmerzen, Muskelkrämpfe (z. B. Wadenkrämpfe), Rückenschmerzen, Zystitis, Erkältungs- u. grippeartige Symptome, Kraftlosigkeit, Schmerzen, Unwohlsein, Gewichtszunahme, Appetitsteigerung, Hitzewallungen, schmerzhafte Lymphknoten, Schilddrüsenstörung. Stand: 03/2019

HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG · Südwestpark 50 · 90449 Nürnberg · www.heumann.de

HEUMANN · bewährt seit 1913