

NEUER NAME. BEWÄHRTE TABLETTE.

Aus VIGANTOLETTEN® wird VIGANTOL®.



Preise bleiben unverändert

VIGANTOLETTEN®

wird zu

VIGANTOL®

Bisherige Bezeichnung: VIGANTOLETTEN®	Anzahl Stück	PZN bisher
VIGANTOLETTEN® 500 I.E. Vitamin D3 Tabletten	50	01245399
VIGANTOLETTEN® 500 I.E. Vitamin D3 Tabletten	100	10944972
VIGANTOLETTEN® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten	50	01245436
VIGANTOLETTEN® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten	100	01245459
VIGANTOLETTEN® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten	200	10544155
Fluor-VIGANTOLETTEN® 500 I.E. Tabletten	90	01909250
Fluor-VIGANTOLETTEN® 1000 I.E. Tabletten	90	01909296

Neue Bezeichnung: VIGANTOL®	Anzahl Stück	PZN neu	Umstellung zum
VIGANTOL® 500 I.E. Vitamin D3 Tabletten	50	13155655	01.09.17
VIGANTOL® 500 I.E. Vitamin D3 Tabletten	100	13155661	
VIGANTOL® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten	50	13155678	
VIGANTOL® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten	100	13155684	
VIGANTOL® 1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten	200	13155690	
Fluor-VIGANTOL® 500 I.E. Tabletten	90	13155709	01.12.17
Fluor-VIGANTOL® 1000 I.E. Tabletten	90	13155715	

Bezeichnung: VIGANTOL® 500 I.E./1000 I.E. Vitamin D3 Tabletten. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt. **Zusammensetzung:** 1 Tablette 500 I.E./1000 I.E. enthält 12,5 µg/25 µg Colecalciferol, entspr. 500 I.E./1000 I.E. Vitamin D. **Sonstige Bestandteile:** Hochdisperses Siliciumdioxid (Ph.Eur.), Maisstärke (Ph.Eur.), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ C) (Ph.Eur.), Talkum (Ph.Eur.), Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Natriumascorbat (Ph.Eur.), mittelkettige Triglyceride (Ph.Eur.), mikrokristalline Cellulose (Ph.Eur.), Mannitol (Ph.Eur.), modifizierte Stärke, Sucrose (Ph.Eur.), α-Tocopherol (Ph.Eur.). **Anwendungsgebiete:** Zur Vorbeugung gegen Rachitis und Osteomalazie bei Kindern und Erwachsenen. Zur Vorbeugung gegen Rachitis bei Frühgeborenen. Zur Vorbeugung bei erkennbarem Risiko einer Vitamin-D-Mangelkrankung bei ansonsten Gesunden ohne Resorptionsstörung bei Kindern und Erwachsenen. Zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose bei Erwachsenen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Colecalciferol od. sonst. Bestandteile. Hypercalcämie u./od. Hypercalciurie, Pseudohypoparathyreoidismus. Nur mit besond. **Vorsicht anwenden bei:** Neigung zur Bildung calciumhaltiger Nierensteine, gestörter renaler Calcium- u. Phosphatausscheidung, Behandl. mit Benzothiadiazin-Derivaten, immobilisierten Pat., Pat. mit Sarcoidose od. Niereninsuff. **Nebenwirkungen:** Stoffwechsel- u. Ernährungsstör., Hypercalcämie u. Hypercalciurie. **Erkrank. des Gastrointest.-trakts:** Gastrointest. Beschwerden wie Obstipation, Flatulenz, Übelk., Abdominalschmerzen od. Diarrhoe. **Erkrank. der Haut u. des Unterhautzellgewebes:** Überempfindlichkeitsreakt. wie Pruritus, Hautausschlag od. Urtikaria. **Warnhinweise u. Vorsichtsmaßnahmen:** Enthält Sucrose

Apothekenpflichtig. Stand: Februar 2017
* Insign Health Umsatz MAT 06/2017.